

IMPFPLAN

6.-12. Woche	Rotaviren-Schluckimpfung (2x im Abstand von 4-6 Wochen)
bei U4	Pneumokokken (3 Impfungen im Abstand von 4-6 Wochen)
bei U5	Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio-Hib-Hep.B (3 Impfungen im Abstand von 4-6 Wochen, Auffrischung nach 9-12 Monaten, nach 5 Jahren, dann alle 10 Jahre ohne Hib und Hep. B)
bei U6	1. Masern-Mumps-Röteln (auf Wunsch mit Varizellen=Windpocken)
13. LM	Meningokokken C
bei U7a	2. Masern-Mumps-Röteln (auf Wunsch mit Varizellen=Windpocken)
bei J1	HPV = Gebärmutterhalskrebs (bei Mädchen)

Jährlich im Herbst wird die Influenza-Impfung empfohlen.
Reise-Impfungen als Selbstzahler-Leistung GOÄ: nach Beratung.
Bei Reisen in Endemie-Gebiete: FSME. Meningokokken B auf
Wunsch nach Besprechung.

Gerne gehen wir auch auf individuelle Impfwünsche ein. Wenn Sie
eine Beratung wünschen, wenden Sie sich bitte an unser
Praxisteam.